

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(Минздрав Пензенской области)

**ПРИКАЗ**

08.07.2020 № 143-о

г. Пенза

**О внесении изменений в Схему маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 20.03.2020 № 37-о (с последующими изменениями)**

В целях обеспечения охраны здоровья населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Пензенской области, руководствуясь подпунктом 2.1.12.4 пункта 2.1., подпунктом 3.1.8. пункта 3.1. Положения о Министерстве здравоохранения Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 30-пП (с последующими изменениями), **приказываю:**

1. Внести изменения в Схему маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 20.03.2020 № 37-о «О введении в действие на территории Пензенской области временного Порядка организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями) (приложение № 1), изложив её в новой редакции:

«

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства  
здравоохранения Пензенской области  
от 20.03.2020 № 37-о

**СХЕМА  
маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии  
в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь  
в стационарных условиях**

№	Возраст пациентов	Категория	Направляющая	Медицинская
---	-------------------	-----------	--------------	-------------

		пациентов	медицинская организация	организация, оказывающая специализированную медицинскую помощь
1.	Пациенты от 0 до 18 лет, имеющие положительный результат обследования на COVID 19	<p>Дети от 0 до 1 года при наличии любого воспалительного процесса в легких по результатам рентгенографии независимо от тяжести заболевания</p> <p>Дети с 1 года до 3 лет при наличии пневмонии по результатам рентгенографии, независимо от тяжести заболевания</p> <p>Дети с 0 до 3 лет легкое и бессимптомное течение COVID 19 - инфекции</p> <p>Дети от 0 до 18 лет при наличии одного из следующих признаков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) температура <math>&gt; 38,5^{\circ}\text{C}</math> в день обращения или <math>&gt; 38^{\circ}\text{C}</math> в течение 5 дней и более;</li> <li>б) дыхательная недостаточность (наличие любого признака из нижеперечисленных симптомов респираторного дистресса): частота дыхания у детей в возрасте до 1 года - более 50, от 1 до 5 лет - более 40, старше 5 лет - более 30 в мин; одышка в покое или при беспокойстве ребенка; участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания; втяжения уступчивых мест грудной клетки при дыхании; раздувание крыльев носа при дыхании; кряхтящее или стонущее дыхание; эпизоды апноэ; кивательные движения головы, синхронные со вдохом; дистанционные хрюпы; невозможность сосать/пить вследствие дыхательных нарушений; акроцианоз или центральный цианоз; <math>\text{SpO}_2</math> менее или равна 95%;</li> <li>в) тахикардия у детей в возрасте до 1 года - более 140, от 1 до 5 лет - более 130, старше 5 лет - более 120 ударов в мин.;</li> <li>г) наличие геморрагической сыпи;</li> <li>д) наличие любого из следующих экстренных и неотложных признаков: судороги; шок; тяжелая дыхательная недостаточность; тяжелое обезвоживание; угнетение сознания (сонливость) или возбуждение;</li> <li>е) наличие одного из следующих тяжелых фоновых заболеваний независимо от уровня повышения температуры и степени выраженности дыхательной недостаточности:</li> </ul> <p>иммунодефицитное состояние, в том числе лечение иммуносупрессивными препаратами; онкологические и онкогематологические заболевания; болезни с нарушениями системы</p>	<p>ГБУЗ* «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»</p> <p>Медицинские организации, имеющие прикрепленное население</p> <p>Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь</p>	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

		<p>свертывания крови;</p> <p>врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе нарушения ритма, кардиомиопатия;</p> <p>врожденные и приобретенные хронические заболевания легких;</p> <p>болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение);</p> <p>хронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного тракта.</p> <p>Легкие и бессимптомные формы у детей старше 3х лет, не имеющих тяжелых фоновых заболеваний при:</p> <p>а) невозможности изоляции при проживании с лицами, относящими к группе риска возраст старше 65 лет; наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени; длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита; пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перitoneальный диализ; наличие иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию (</p> <p>б) отсутствии условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций (общежитие, учреждения социального обеспечения, пункт временного размещения, социально неблагополучная семья, неблагоприятные социально-бытовые условия)</p>	
2.	Пациенты от 0 до 18 лет, контактировавшие с больным COVID-19, независимо от результатов обследования на COVID-19	При наличии ( появлении) признаков, не исключающих COVID-19, в соответствии с критериями госпитализации	
3.	Пациенты от 0 до 18 лет, не имеющие результата обследования и с отрицательным результатом обследования на COVID-19	<p>Дети от 0 до 1 года при наличии любого воспалительного процесса в легких по результатам рентгенографии независимо от тяжести заболевания</p> <p>Дети с 1 года до 3 лет при наличии пневмонии по результатам рентгенографии, независимо от тяжести заболевания</p> <p>Дети от 0 до 18 лет при наличии одного из следующих признаков:</p> <p>а) температура <math>&gt; 38,5^{\circ}\text{C}</math> в день обращения или <math>&gt; 38^{\circ}\text{C}</math> в течение 5 дней и более;</p> <p>б) дыхательная недостаточность (наличие любого признака из нижеперечисленных симптомов респираторного дистресса): частота дыхания у детей: в возрасте до 1 года - более 50, от 1 до 5</p>	<p>ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»</p> <p>Медицинские организации, имеющие прикрепленное население</p> <p>Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь</p> <p>ГБУЗ «Пензенская областная клиническая детская больница им. Н.Ф. Филатова»</p>

	<p>лет - более 40,      старше 5 лет - более 30 в мин;      одышка в покое или при беспокойстве ребенка;      участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания;      втяжения уступчивых мест грудной клетки при дыхании;      раздувание крыльев носа при дыхании;      кряхтящее или стонущее дыхание;      эпизоды апноэ;      кивательные движения головы,      синхронные со вдохом;      дистанционные хрипы;      невозможность сосать/пить вследствие дыхательных нарушений;      акроцианоз или центральный цианоз;  <math>\text{SpO}_2</math> менее или равна 95%;      в) тахикардия у детей в возрасте до 1 года - более 140,      от 1 до 5 лет - более 130,      старше 5 лет - более 120 ударов в мин.;      г) наличие геморрагической сыпи;      д) наличие любого из следующих экстренных и неотложных признаков:      судороги;      шок;      тяжелая дыхательная недостаточность;      тяжелое обезвоживание;      угнетение сознания (сонливость) или возбуждение;      е) наличие одного из следующих тяжелых фоновых заболеваний независимо от уровня повышения температуры и степени выраженности дыхательной недостаточности:      иммунодефицитное состояние,      в том числе лечение иммуносупрессивными препаратами;      онкологические и онкогематологические заболевания;      болезни с нарушениями системы свертывания крови;      врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе нарушения ритма, кардиомиопатия;      врожденные и приобретенные хронические заболевания легких;      болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение);      хронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного тракта.</p> <p>Легкие и бессимптомные формы у детей старше 3х лет, не имеющих тяжелых фоновых заболеваний при:</p> <p>а) невозможности изоляции при проживании с лицами, относящими к группе риска (возраст старше 65 лет; наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени; длительный прием стероидов и биологической</p>	
--	--	--

		терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита; пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перitoneальный диализ; наличие иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию; б) отсутствии условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций (общежитие, учреждения социального обеспечения, пункт временного размещения, социально неблагополучная семья, неблагоприятные социально-бытовые условия).		
4.	Пациенты, перечисленные в пункте 2	При получении положительного результата на COVID-19	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая детская больница им. Н.Ф. Филатова»	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
5.	Пациенты от 0 до 18 лет с отрицательным результатом обследования на COVID-19, не имеющие тяжелых фоновых заболеваний, перечисленных в пунктах 1 и 2	Легкие** формы течения ОРВИ у пациентов при: а) невозможности изоляции при проживании с лицами, относящими к группе риска; б) отсутствии условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций (общежитие, учреждения социального обеспечения, пункт временного размещения, социально неблагополучная семья, неблагоприятные социально-бытовые условия).	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»  Медицинские организации, имеющие прикрепленное население	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая детская больница им. Н.Ф. Филатова»
		г. Пенза, Бессоновский, Иссинский, Луенинский, Мокшанский, Пензенский районы		ГБУЗ «Кузнецкая МРДБ***»
		г. Кузнецк, Камешкирский, Кузнецкий, Лопатинский, Никольский, Неверкинский, Сосновоборский районы		ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ****»
		Вадинский, Земетчинский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский, Спасский районы		ГБУЗ «Каменская МРБ»
		Башмаковский, Белинский, Каменский, Тамалинский районы		ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина»
		Бековский, Колышлейский, Малосердобинский, Сердобский районы		ФГБУЗ ***** «Медико-санитарная часть № 59 ФМБА России»
		г. Заречный		
6.	Пациенты от 18 лет и старше	Беременные, пациенты с внебольничной пневмонией средней***** степени тяжести и тяжелой***** степени тяжести, имеющие положительный анализ на COVID-19	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»  Медицинские организации, имеющие прикрепленное население	ГБУЗ «Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи»
		Беременные, пациенты с внебольничной пневмонией тяжелой степени тяжести,	Медицинские организации,	ГБУЗ «Пензенский областной центр

	имеющие положительный анализ на COVID-19	оказывающие специализированную медицинскую помощь	специализированных видов медицинской помощи»
	Беременные, пациенты с внебольничной пневмонией средней и тяжелой степени тяжести, имеющие положительный анализ на COVID-19	ГБУЗ «Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи»	ГБУЗ «Мокшанская РБ»
	Пациенты с внебольничной пневмонией тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести******, включая пневмонию, вызванную COVID-19	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» Медицинские организации, имеющие прикрепленное население	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»
Пациенты с внебольничной пневмонией средней степени тяжести, пациенты категории группы риска******, вне зависимости от тяжести состояния, пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем:			
	из города Пензы, Башмаковского, Бековского, Белинского, Бессоновского, Вадинского, Городищенского, Земетчинского, Иссинского, Каменского, Колышлейского, Лопатинского, Лунинского, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Никольского Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Спасского, Тамалинского, Шемышейского районов	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»  Медицинские организации, имеющие прикрепленное население  Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь	ГБУЗ «Бессоновская РБ»*****  ГБУЗ «Клиническая больница № 4»  ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн»  ГБУЗ «Пензенская РБ»  ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»  по графику дежурств, посменно, с 08-00 до 08-00
	из г. Кузнецка, Кузнецкого, Камешкирского, Неверкинского, Сосновоборского районов	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» ГБУЗ «Кузнецкая МРБ» (включая все структурные обособленные подразделения) ГБУЗ «Сосновоборская УБ»	ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»
	из г. Заречный	ФГБУЗ «Медико-	ФГБУЗ «Медико-

		санитарная часть № 59 ФМБА России»	санитарная часть № 59 ФМБА России»
--	--	--	---------------------------------------

\* ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

\*\* Критерии легких форм течения ОРВИ у детей от 0 до 18 лет:

а) повышение температуры тела не выше 38,5<sup>0</sup>С в первые два дня заболевания и не выше 38<sup>0</sup>С в последующие три дня,

б) отсутствие одышки,

в) SpO<sub>2</sub> выше 95%,

г) отсутствие критериев крайне тяжелого, тяжелого и среднетяжелого течения заболевания:

- диспноэ (чувство нехватки воздуха, стеснение в грудной клетке, одышка или тахипное), цианоз/ акроцианоз, SpO<sub>2</sub>ниже или равна 93%,

- развитиедыхательной недостаточности с необходимостью респираторной поддержки, респираторного дистресс-синдрома, шока, полиорганной недостаточности(энцефолопатии, сердечно-сосудистой, почечной, печеночной недостаточности, ДВС – синдрома);

Критерии среднетяжелых форм течения ОРВИ у детей от 0 до 18 лет:

а) повышение температуры тела выше 38,5<sup>0</sup>С,

б) наличие одышки при физической нагрузке (крике/плач),

в) SpO<sub>2</sub>ниже или равна 95 %,

г) отсутствие критериев крайне тяжелого и тяжелого течения заболевания:

- диспноэ (чувство нехватки воздуха, стеснение в грудной клетке, одышка или тахипное), цианоз/ акроцианоз, SpO<sub>2</sub>ниже или равна 93%,

- развитиедыхательной недостаточности с необходимостью респираторной поддержки, респираторного дистресс-синдрома, шока, полиорганной недостаточности (энцефолопатии, сердечно-сосудистой, почечной, печеночной недостаточности, ДВС – синдрома);

\*\*\* МРДБ – межрайонная детская больница;

\*\*\*\* МРБ – межрайонная больница;

\*\*\*\*\*ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

\*\*\*\*\* Пациенты, находящиеся в состоянии средней тяжести, госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, не требующих искусственной вентиляции легких, исходя из наличия двух из следующих критериев:

а) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии SpO<sub>2</sub>< 95%;

б) T ≥ 38 °C;

в) частота дыхательных движений (ЧДД)> 22;

г) наличие признаков пневмонии с распространностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов компьютерной томографии легких).

Оценка степени тяжести пневмонии по объему поражения легочной ткани:

- пневмония легкой степени тяжести – менее 25%,

- пневмония средней степени тяжести – от 25% до 50%,

- пневмония тяжелой степени тяжести – от 50% до 75%,

- пневмония критической степени тяжести – выше 75%.

Пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, при сохранении температуры тела ≥38,5 °C в течение 3-х дней госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся

в состоянии средней тяжести;

\*\*\*\*\*Пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, требующих проведения неинвазивной вентиляции легких, исходя из наличия двух из следующих критериев:

- а)  $\text{SpO}_2 \leq 93\%$ ;
- б)  $T \geq 39^\circ\text{C}$ ;
- в) ЧДД  $\geq 30$  в минуту;

дополнительными признаками нахождения пациента в тяжелом состоянии являются снижение уровня сознания, ажитация, нестабильные гемодинамические показатели (sistолическое артериальное давление  $< 90$  мм рт. ст., диастолическое артериальное давление  $< 60$  мм рт. ст.);

\*\*\*\*\*Пациенты, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, требующих проведения инвазивной искусственной вентиляции легких, исходя из наличия двух из следующих критериев:

- а) нарушение сознания;
- б)  $\text{SpO}_2 < 92\%$  (на фоне кислородотерапии);
- в) ЧДД  $> 35$  в минуту;

\*\*\*\*\*Пациенты, относящиеся к группе риска:

а) возраст старше 65 лет; наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени; длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита; пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перitoneальный диализ; наличие иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию;

б) пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Пациенты, относящиеся к группе риска, находящиеся в состоянии легкой степени тяжести, госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, исходя из наличия двух из следующих критериев:

- а)  $\text{SpO}_2 \geq 95\%$  (обязательный критерий);
- б)  $T < 38^\circ\text{C}$ ;
- в) ЧДД  $\leq 22$  в минуту.

\*\*\*\*\*РБ – районная больница.

Пациенты от 0 до 18 лет считаются выздоровевшими при наличии следующих критериев:

- а) отсутствие клинических проявлений болезни;
- б) два отрицательных результата лабораторных исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV2, взятых с интервалом, не менее 1 суток.

Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 0 до 18 лет на долечивание в амбулаторных условиях разрешается до получения второго отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV2, результат которого после получения подлежит обязательному отражению в первичной медицинской документации пациента, при наличии следующих критериев:

- а) стойкое улучшение клинической картины, компенсированное состояние по любому сопутствующему/ фоновому заболеванию
- б) купирование дыхательной недостаточности (купироване всех признаков респираторного дистресса) SpO<sub>2</sub> >95%;
- в) купирование лихорадки;
- г) отсутствие сыпи;
- д) нормализация маркеров воспаления в лабораторных анализах (уровень лейкоцитов <15 тыс/мкл, уровень нейтрофилов <10 тыс/мкл уровень С-реактивного белка <30 мг/л уровень прокальцитонина <0,5 нг/мл)

Пациенты в возрасте 18 и старше лет считаются выздоровевшими при наличии следующих критериев:

- а) Т тела < 37,2 °C;
- б) SpO<sub>2</sub> на воздухе > 96%;
- в) два отрицательных результата лабораторных исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV2, взятых с интервалом не менее 1 суток.

Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 18 лет и старше на долечивание в амбулаторных условиях разрешается до получения второго отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV2, результат которого после получения подлежит обязательному отражению в первичной медицинской документации пациента, при наличии следующих критериев:

- стойкое улучшение клинической картины;
- исчезновение лихорадки (Т тела < 37,5 °C);
- отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности при SpO<sub>2</sub> на воздухе  $\geq$  95%;
- уровень С-реактивного белка < 10 мг/л;
- уровень лейкоцитов в крови  $> 3,0 \times 10^9/\text{л}$ .

Рентгенография и/или КТ перед выпиской для оценки динамики пневмонии не являются обязательными процедурами, но могут быть назначены лечащим врачом по клиническим показаниям. В остальных случаях контрольная рентгенография и/или КТ выполняется в амбулаторных условиях через 1 – 2 месяца после выписки пациента из стационара.

Рентгенологические критерии регресса патологических изменений:

- уменьшение зон «матового стекла», допустимы новые зоны «матового стекла» не более 25% поперечного размера гемоторакса;
- уменьшение в объеме видимых ранее зон консолидации;
- резидуальные уплотнения паренхимы вариабельные по протяженности и локализации;
- отсутствие плеврального выпота, ассоциированного с COVID-19 инфекцией.

В амбулаторных условиях контрольные исследования проводят не ранее, чем через месяц после выписки. Контрольное исследование не проводится в случае легкого течения перенесенного заболевания без специальных клинических показаний.

Контроль на амбулаторном этапе проводится с использованием того же метода (рентгенография или КТ), который был использован для последнего исследования перед выпиской в стационаре.

Информация о выписке пациента из медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, передается в медицинскую организацию, в которой пациенту будет оказываться медицинская помощь в амбулаторных условиях.


При наличии двух отрицательных результатов лабораторных исследований на РНК SARS-CoV2, взятых с интервалом не менее 1 суток, пациент выписывается и транспортируется любым доступным транспортом (личным или общественным).

При выписке пациента до получения второго отрицательного результата лабораторного исследования его транспортировка осуществляется санитарным транспортом при условии использования водителем и сопровождающим медицинским работником средств индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы).».

2. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на официальном сайте Министерства здравоохранения Пензенской области и на официальном интернет-портале правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра, координирующего и контролирующего вопросы организации медицинской помощи.

Министр



А.В. Никишин