



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

П Р И К А З

от 02.10.2020г.
№ 1322 пр/20

г. Кызыл

Об утверждении временного порядка обеспечения лекарственными препаратами лиц с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях (на дому)

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19» (Версия 8.1), утвержденными заместителем министра здравоохранения Российской Федерации от 1 октября 2020 г., **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

Временный порядок обеспечения лекарственными препаратами лиц с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) для лечения в амбулаторных условиях (на дому);

Рекомендованные схемы лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях (на дому);

Форму отчета лекарственного обеспечения пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях (на дому).

2. Главным врачам медицинских организаций Республики Тыва обеспечить:

составление списка пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), находящихся в амбулаторных условиях (на дому), для лекарственного обеспечения;

доставку на дом лекарственных препаратов лицам с легкими формами заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

целевое использование лекарственных препаратов, предназначенных для лечения на дому лиц с легкими формами заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

еженедельное предоставление (по пятницам) отчета лекарственного обеспечения пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях (на дому) в отдел организации лекарственного обеспечения ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Республики Тыва».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Республики Тыва Куулар М.Д.

4. Сектору организационного, документационного обеспечения и контроля Министерства здравоохранения Республики Тыва направить копию настоящего приказа в медицинские организации Республики Тыва, оказывающих первичную медико-санитарную помощь больным, и ознакомить Куулар М.Д. под роспись.

5. Разместить настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Тыва.

Министр



А.М. Сат

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
обеспечения лекарственными препаратами лиц с
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
в амбулаторных условиях (на дому)

1. Временный порядок обеспечения лекарственными препаратами лиц с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях (на дому) (далее - Временный порядок) регулирует обеспечение лекарственными препаратами лиц с легкими формами заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - пациенты) при их лечении на дому.

2. Обеспечению лекарственными препаратами на дому подлежат лица с подтвержденным диагнозом COVID-19, внесенные в информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при легком течении заболевания.

3. Пациенты для лечения на дому в зависимости от медицинских показаний по назначению лечащего врача подлежат обеспечению лекарственными препаратами согласно рекомендованным схемам лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных условиях (на дому).

4. При оказании медицинской помощи пациенту в амбулаторных условиях (на дому) оформляется согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 согласно форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва от 26 октября 2020 г. № 1288пр/20 «Об организации оказания медицинской помощи пациентам при подозрении и с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19».

5. В медицинских организациях республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, приказом по учреждению назначается лицо, ответственное за обеспечение лекарственными препаратами пациентов для лечения на дому (далее - ответственный).

6. Лечащий (участковый) врач передает незамедлительно ответственному лицу, информацию о лицах с подтвержденным диагнозом легкой формы новой коронавирусной инфекции (COVID-19), нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами на дому, для формирования реестра доставки лекарственных препаратов.

7. Ответственный сотрудник медицинской организации в день получения информации о лицах с подтвержденным диагнозом легкой формы новой коронавирусной инфекции (COVID-19), нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами на дому, формирует список пациентов с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), находящихся в амбулаторных условиях (на дому), для лекарственного обеспечения и передает их медицинским работникам по территориально-участковому принципу для доставки лекарственных препаратов.

Доставка лекарственных препаратов осуществляется участковым врачом или ковид-бригадой в срок не позднее дня, следующего за днем формирования реестра.

8. После передачи медицинским работником пациенту лекарственных препаратов, пациент ставит свою подпись в реестре доставки на бумажном носителе.

В случае нарушения пациентом режима самоизоляции и отсутствия его по адресу доставки медицинский работник делает соответствующую отметку в реестре и информирует органы правопорядка о нарушении режима изоляции пациентом.

Утвержден
 приказом Минздрава РТ
 от 02.11.2020 № 1322.рп/20

**РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
 СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
 (НА ДОМУ)**

	№	Препарат	Режим дозирования
Легкое течение			
Схема 1	1	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела <75 кг: по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут со 2 по 10 день. Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.
	2	ИФН-а, интраназальные формы	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз
	3	Парацетамол	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
Схема 2	1	Умифеновир	200 мг 4 р/сут в течение 5-7 дней
	2	ИФН-а, интраназальные формы	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз
	3	Парацетамол	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
Среднетяжелое течение (без пневмонии)			
Схема 1	1	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела <75 кг: по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут со 2 по 10 день. Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.
	2	ИФН-а, интраназальные формы	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз
	3	Парацетамол	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки
	4	Ривароксабан *	10 мг 1 р/сут в течение 30 дней
		или Апиксабан*	2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней

Схема 2	1	Г гидроксихлорохин	400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в сутки (100 мг 2 р/сут), в течение 6-8 дней		
	2	ИФН-а, интраназальные формы	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз		
	3	Парацетамол	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки		
	4	Ривароксабан *	10 мг 1 р/сут в течение 30 дней		
или Апиксабан*		2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней			
При появлении признаков бактериальной суперинфекции (лейкоцитоз > 10 тыс./мкл, палочкоядерный сдвиг >6%, гнойная мокрота, повышение прокальцитонина > 0.5 нг/мл) в схему 1 и 2 назначается антибактериальная терапия длительностью 5-10 дней					
	5	Амоксициллин +клавулановая кислота	0,5 г внутрь каждые 8 ч или 0,875 г внутрь каждые 12 ч или 2 г внутрь каждые 12 ч (таблетки с модифицированным высвобождением)		
		или Амоксициллин	0,5 или 1 г (предпочтительно) внутрь каждые 8 ч		
		или Азитромицин	0,5 г внутрь в 1-й день, затем по 0,25 г каждые 24 ч (5-дневный курс)		
		или Левофлоксацин	0,5 г внутрь каждые 12 ч или 0,75 г каждые 24 ч		
		или Моксифлоксацин	0,4 г внутрь каждые 24 ч		
		или Кларитромицин	0,5 г внутрь каждые 12 ч		
		Среднетяжелое течение (с пневмонией)			
		Схема 1	1	Фавипиравир	Для пациентов с массой тела <75 кг: по 1600 мг 2 р/сут в 1-й день и далее по 600 мг 2 р/сут со 2 по 10 день. Для пациентов с массой тела 75 кг и более: по 1800 мг 2 раза/сут в 1-й день, далее по 800 мг 2 раза/сут со 2 по 10 день.
Ривароксабан *	10 мг 1 р/сут в течение 30 дней				
2	или Апиксабан*		2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней		
	Дексаметазон**		6 мг/сут в течение 5-10 дней		
3	или Преднизолон* *		45 мг/сут в течение 5-10 дней		
	или Метилпреднизолон* *		36 мг/сут в течение 5-10 дней		

	4	ИФН-а, интраназальные формы	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз	
	5	Парацетамол	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки	
Схема 2	1	Г гидроксихлорохин	400 мг в 1-й день (200 мг 2 р/сут), далее 200 мг в сутки (100 мг 2 р/сут), в течение 6-8 дней	
	2	Ривароксабан*	10 мг 1 р/сут в течение 30 дней	
		или Апиксабан*	2,5 мг 2 р/сут в течение 30 дней	
	3	Дексаметазон **	6 мг/сут в течение 5-10 дней	
		или Преднизолон* *	45 мг/сут в течение 5-10 дней	
		или Метилпреднизолон* *	36 мг/сут в течение 5-10 дней	
	4	ИФН-а, интраназальные формы	По 3 капли в каждый носовой ход (3000 МЕ) 5 р/сут в течение 5 дней; впрыскивание 5-6 раз	
	5	Парацетамол	1-2 табл. (500-1000 мг) 2-3 р/сут, не более 4 г в сутки	
	При появлении признаков бактериальной суперинфекции (лейкоцитоз > 10 тыс./мкл, палочкоядерный сдвиг >6%, гнойная мокрота, повышение прокальцитонина > 0.5 нг/мл) в схему 1 и 2 назначается антибактериальная терапия длительностью 5-10 дней			
	6	Амоксициллин + клавулановая кислота		0,5 г внутрь каждые 8 ч или 0,875 г внутрь каждые 12 ч или 2 г внутрь каждые 12 ч (таблетки с модифицированным высвобождением)
или Амоксициллин		0,5 или 1 г (предпочтительно) внутрь каждые 8 ч		
или Азитромицин		0,5 г внутрь в 1-й день, затем по 0,25 г каждые 24 ч (5-дневный курс)		
или Левифлоксацин		0,5 г внутрь каждые 12 ч или 0,75 г каждые 24 ч		
или Моксифлоксацин		0,4 г внутрь каждые 24 ч		
или Кларитромицин		0,5 г внутрь каждые 12 ч		

Примечание: Фавипиравир рекомендуется использовать в лечении лиц из групп риска: лиц старше 65 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и бронхолегочной систем, у которых возможна прогрессирование заболевания до тяжелых форм. Не назначать детям до 18 лет., беременным женщинам.

*при наличии факторов риска тромбообразования

**по показаниям (сочетание данных КТ (объем поражения более 50% (КТ3-4) с двумя и более признаками: снижение SpO2 < 93%; СРБ > 40 мг/л; лихорадка > 38°C в течение 5 дней).

